Examen de Psychiatrie (2019-2020)

QCM1
Parmi les propositions suivantes, laquelle caractérise le syndrome maniaque ? (cochez la réponse juste)
A-Fuite d'idées
B-Thèmes délirants de grandeur
C-Achats inconsidérés
D-Hyperactivité motrice désordonnée
E- A+B+C+D

QCM2
La psychose maniaco-dépressive de forme bipolaire (cochez la réponse juste)
A-Comporte des accès maniaques et dépressifs
B-A souvent un caractère familial
C-Est sensible à l'action prophylactique par les sels de lithium
D-Débute le plus souvent après 50 ans

QCM3
Un arrêt brusque dans le déroulement et l'énonciation de la pensée définit : (cochez la réponse juste)
A- Une phobie
B- Une amnésie sélective
C- « Saut du coq à l'âne »
D- Un barrage
E- Une obsession

QCM4
La bouffée délirante aiguë (cochez la réponse juste)
A- Est une psychose aiguë
B- Elle touche généralement des personnes jeunes
C- Les délires sont polythématiques et à mécanismes divers qui durent moins d'un mois
D- Peut s'accompagner d'un automatisme mental
E- A+B+C+D

QCM5
Parmi les thèmes délirants suivant, lequel est celui qui évoque un accès mélancolique ? (cochez la réponse juste)
A- Délire de grandeur
B- Syndrome d'influence
C- Délire de jalousie
D- Incurabilité
E- Délire mystique

QCM6
Le rationalisme morbide évoque une affection mentale: laquelle ? (cochez la réponse juste)
A- Troubles obsessionnels compulsifs
B- Confusion mentale
C- Troubles somatoformes
D- Schizophrénie
E- Paraphrénie

QCM7
Parmi les propositions suivantes, laquelle caractérise la confusion mentale ? (cochez la réponse juste)
A- Un trouble de l'attention
B- Une désorientation temporospatiale
C- Une reprise de la conscience
D- Délire onirique
E- A+B+C+D

QCM8
Parmi les délires paranoïaques de revendication (cochez les réponses justes)
A- Les inventeurs méconnus
B- Les idéalistes passionnés
C- La sinistrose délirante
D- L'érotomanie
E- Les quérulents processifs

QCM9
La dépression est définie par (cochez la réponse juste)
A- Une humeur affaissée
B- Un ralentissement psychomoteur
C- Une diminution de l'appétit
D- Troubles du sommeil
E- A+B+C+D

QCM10
Le risque suicidaire est d'autant plus élevé (cochez la réponse juste)
A- Que la dépression est sévère
B- Qu'il existe des antécédents familiaux ou personnels de tentative de suicide
C- Chez les hommes
D- Qu'un plan suicidaire est déjà établi

QCM11
Les neuroleptiques (cochez la réponse fausse)
A- Ont été découverts fortuitement
B- Font partie des psychodysleptiques
C- Constituent la principale classe thérapeutique es psychoses
D- Peuvent être à l'origine d'effets secondaires extra-pyramidaux
E- Ont une action anti-maniaque

QCM12
Le syndrome malin des neuroleptiques (cochez les réponses justes)
A- Est la complication la plus grave des neuroleptiques
B- Il est pris en charge par les psychiatres
C- La fièvre peut manquer dans le tableau clinique
D- Peut être traité initialement par les agonistes dopaminergiques comme la bromocriptine
E- Le neuroleptique mis en cause peut être réintroduit chez le même patient ultérieurement

QCM13
Quel est le critère qui ne fait pas partie de la définition des neuroleptiques selon Delay et Deniker ? (cochez la réponse fausse)
A- Création d'un état d'indifférence psychomotrice
B- Efficacité sur les personnalités pathologiques
C- Réduction progressive des troubles psychotiques aigus et chroniques
D- Apparition de symptômes extrapyramidaux et végétatifs
E- Effets dominants sur les structures sous-corticales

QCM14
Les équivalents suicidaires sont : (cochez les réponses justes)
A- Les automutilations
B- Le refus alimentaire
C- Les conduites de fugue
D- Les conduites automobiles à grandes vitesses
E- La boulimie

QCM15
Concernant les phobies (cochez les réponses fausses)
A- Sont des peurs rationnelles pour le sujet
B- Sont des peurs irrationnelles reconnues par le sujet
C- L'agoraphobie est la peur des hauteurs
D- Le comportement d'évitement est commun à toutes les phobies
E- Le traitement fait appel aux antidépresseurs et aux thérapies cognitivo-comportementales

QCM16
La phobie sociale (cochez la réponse fausse)
A- Est la peur d'être exposé à l'attention des autres et d'être humilié et ridiculisé
B- Est la peur des grands espaces
C- Peut se compliquer d'un épisode dépressif
D- L'évitement peut entrainer des altérations des relations sociales et professionnelles
E- Le traitement fait appel aux antidépresseurs et aux thérapie cognitivo-comportementale

QCM17
Concernant les antidépresseurs : (cochez les réponses fausses)
A- Sont efficaces sur les états dépressifs et les troubles anxieux
B- Peuvent donner des effets extrapyramidaux
C- Sont indiqués dans les syndromes douloureux chroniques
D- Les ISRS ont la même efficacité clinique que les tricycliques
E- Les ISRS ont plus d'effets secondaires que les tricycliques

QCM18
Le tableau clinique de la dépression est fait de (cochez la réponse fausse)
A- Un ralentissement psychomoteur
B- Une humeur dépressive
C- Une familiarité de contact
D- Des troubles des fonctions instinctuelles
E- Une anxiété

QCM19
Dans les troubles conversifs (conversion hystérique) quelle est la caractéristique fausse ?
A- Absence de l'organicité
B- Absence de systématisation anatomo-physiologique
C- Existence d'un contrôle volontaire et de simulation des symptômes
D- Peu d'angoisse accompagnant le discours sur le symptôme : belle indifférence
E- Existence de bénéfices secondaires

QCM20
Concernant les effets des tranquillisants ; tous ces effets sont justes sauf un, lequel ?
A- Amnésiant
B- Myorelaxant
C- Réduction de l'appétit
D- Anticonvulsivant
E- Anxiolytique